




Avertissements agricoles

BRETAGNE

SERVICE DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX

280, rue de Fougères, 35000 RENNES ☎ (99) 36 01 74



Publication périodique

BULLETIN TECHNIQUE DE LA STATION D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES

ÉDITION : CÉRÉALES

BULLETIN N° 14

(Supplément au bulletin n° 103)

7 novembre 1984

JAUNISSE NANISANTE

Les conditions climatiques de ces deux dernières semaines ont été favorables à la contamination des jeunes semis par les pucerons vecteurs de la jaunisse nanisante. Surveillez vos orges et vos blés dès la sortie de la 2ème feuille pour déceler la présence de pucerons :

- Semis effectués avant le 20 octobre (stade 3 feuilles atteint ou dépassé) : intervenez (rapidement) avec l'un des insecticides indiqués dans le tableau ci-dessous :

- Semis effectués entre le 20 et le 30 octobre : intervenez à partir du stade 2 - 3 feuilles lorsque 10 à 20 % des plants sont infestés.

L'EMPLOI D'UN INSECTICIDE AVANT LE STADE 2 FEUILLES EST DECONSEILLE

Insecticides utilisables contre les pucerons vecteurs de la jaunisse nanisante :

Matière active	Spécialité	Dose l / ha
bromophos	NEXION EC 40	1,0
	SOVI NEXION 25 EM	1,5
	RHODIANEX	1,5
cyperméthrine	CYMBUSH	0,2
	KAFIL SUPER	0,2
	SHERPA 10	0,2
deltaméthrine	DECIS	0,3
fenvalérate	SUMICIDIN 10	0,25
perméthrine	AMBUSH	0,25

P54